

## Stručné instrukce k stěru sliznice ústní dutiny

Odběrku pro stěr sliznice ústní dutiny si můžete objednat v laboratoři Genomia online (objednávkový systém Vám přidělí číslo vzorku, které můžete používat pro jednoznačnou identifikaci vyšetřovaného jedince), emailem nebo telefonicky. Je možné použít i vlastní sterilní odběrku pro stěr sliznice.

Stěr sliznice ústní dutiny může provést chovatel nebo veterinární lékař, který zároveň může potvrdit správnost původu vzorku.

Souprava na stěr sliznice ústní dutiny, kterou dodává Genomia, obsahuje:

- sterilní kartáček (zákazníkům mimo Českou republiku posíláme dva odběrové kartáčky pro jedno zvíře)
- obdélníkovou obálku na uložení kartáčku
- bublinkovou obálku se zpáteční adresou

## Postup stěru sliznice ústní dutiny:

*Doporučení: V daný okamžik odebírejte vzorek pouze od jednoho zvířete. V případě odebírání vzorků od několika zvířat ve stejném čase, vždy kompletně dokončete odběr jednoho zvířete, než začnete odebírat vzorek od dalšího. Zamezíte tak vzájemné kontaminaci vzorků.*

1. Na přiloženou obdélníkovou obálku čitelně napište jednoznačnou identifikaci vyšetřovaného zvířete (číslo vzorku, pokud Vám bylo přiděleno; jméno zvířete; čip...).
2. Zvíře by mělo mít před odběrem čistou ústní dutinu. Je vhodné, aby 15 minut před stěrem nejedlo ani nepilo.
3. Vyjměte sterilní kartáček z obalu. Štětinek kartáčku se nedotýkejte! Dávejte pozor, aby se štětinky kartáčku nedotkly jiného povrchu než ústní dutiny odebíraného jedince.
4. Umístěte kartáček mezi lící a čelist a setřete cca 10 x protisměrným tahem i rotací kartáčku. Pokuste se zajistit kontakt z obou stran kartáčku. Po dokončení stěru by mělo být na kartáčku zachyceno viditelné množství buněk.
5. Kartáček nechte chvíli oschnout na vzduchu - držte jej, nepokládejte. Na vlhkém kartáčku by mohly cestou do laboratoře začít hnilobné procesy.
6. Suchý kartáček vložte přímo do označené obdélníkové obálky. Obálku zalepte.
7. Označenou obdélníkovou obálku s kartáčkem vložte do bublinkové obálky se zpáteční adresou a odešlete běžnou poštou na adresu laboratoře: **Genomia s.r.o., Teslova 3, 301 00 Plzeň, Česká republika**

## Opatření při stírání sliznice kojenných mláďat!

Při odebírání stěru ústní dutiny kojenným mláďatům hrozí kontaminace buňkami matky. Rovněž vzájemné olizování mezi mláďaty může vést ke zkreslení výsledku vyšetření!

Upozorňujeme, že kojenná mláďata by měla být před stěrem aspoň 30 min bez kontaktu s matkou a ostatními sourozenci. Vhodné je, aby se mláďata napila nebo najedla, čímž si mechanicky očistí ústní dutinu. Po posledním jídle nebo pití je nechejte ještě 15 min a pak teprve proveďte stěr.